Материалы XII Научно-практической конференции молодых ученых-медиков с международным участием «Трансляционная медицина: возможное и реальное»*

Возможности флеш-мониторирования гликемии как метода непрерывного измерения уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом в клинической практике

Атабаева Х.В., Демидова Т.Ю., Титова В.В.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

Контроль гликемического профиля – важная составляющая терапии сахарного диабета. И в настоящее время активно внедряются инновационные методики непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). В статье описаны результаты опыта применения системы флеш-мониторирования гликемии (ФМГ) для контроля глюкозы крови у пациентов с сахарным диабетом как 1-го, так и 2-го типа, изучения роли ФМГ в оценке основных параметров гликемического профиля в сравнении с самоконтролем глюкозы крови по глюкометру, а также отражены основные преимущества НМГ как инновационного метода контроля гликемии в сравнении с традиционным контролем глюкозы крови по глюкометру.

Ключевые слова: FreeStyle Libre, сахарный диабет, гликемический контроль, флеш-мониторирование гликемии, непрерывный мониторинг глюкозы, глюкометр, вариабельность глюкозы

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Атабаева Х.В., Демидова Т.Ю., Титова В.В. Возможности флеш-мониторирования гликемии как метода непрерывного измерения уровня глюкозы у пациентов с сахарным диабетом в клинической практике // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 4. С. 99–100. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-99-100>

Статья поступила в редакцию 02.11.2021. **Принята в печать** 24.11.2021.

Possibilities of flash glucose monitoring as a method of continuous glucose monitoring in patients with diabetes mellitus in clinical practice

Atabaeva Kh.V., Demidova T.Yu., Titova V.V.

Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

Control of glycemic profile is the most important aspect of diabetes therapy. Nowadays innovative methods of continuous glucose monitoring (CGM) are being actively introduced. The article describes the results of the experience of using a flash glycemic monitoring system (FGM) to control blood glucose in patients with both type 1 and type 2 diabetes mellitus, studying the role of FGM in assessing the main parameters of the glycemic profile in comparison with self-monitoring of blood glucose using a glucose meter.

* Окончание. Начало см. в журнале «Эндокринология: новости, мнения, обучение» № 2 и 3, 2021.

Also this article represents the main advantages of CGM as an innovative method of glycemic control in comparison with traditional control of blood glucose using a glucose meter.

Keywords: FreeStyleLibre, diabetes mellitus, glycemic control, flash glucose monitoring, continuous glucose monitoring, glucose meter, variability of glucose

Funding. The study had no sponsor support.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Atabaeva Kh.V., Demidova T. Yu., Titova V.V. Possibilities of flash glucose monitoring as a method of continuous glucose monitoring in patients with diabetes mellitus in clinical practice. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obucheniye [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 (4): 99–100. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-99-100> (in Russian)

Received 02.11.2021. **Accepted** 24.11.2021.

Сахарный диабет (СД) на сегодняшний день является одной из актуальнейших проблем мирового здравоохранения. Эффективное управление течением СД зависит от того, насколько качественно оценивается гликемический контроль. Более того, значимым барьером при достижении компенсации углеводного обмена является риск развития гипогликемий, приводящих к повышению сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Вместе с гипогликемиями важное значение придается и вариабельности гликемии, с которой ассоциируется возможное развитие микрососудистых осложнений СД. И одним из многообещающих направлений в лечении СД, позволяющих максимально точно оценить вариабельность глюкозы в течение суток и выбрать индивидуальную лечебную тактику у пациентов с СД, являются инновационные методики непрерывного мониторирования глюкозы (НМГ), в частности флеш-мониторирования гликемии (ФМГ), позволяющее, в отличие от контроля глюкозы глюкометром, выявить случаи бессимптомных гипогликемий для последующей коррекции сахароснижающей терапии и профилактики развития возможных осложнений.

Цель – изучить роль метода ФМГ в оценке таких параметров, как вариабельность глюкозы, время ее нахождения в целевом диапазоне, частота и продолжительность эпизодов гипо- и гипергликемии в сравнении с самоконтролем глюкозы крови по глюкометру.

Материал и методы

В работе использованы данные 30 пациентов, которым проводили НМГ при помощи системы ФМГ FreeStyle Libre, среди них 12 пациентов с СД 1-го типа, 18 пациентов с СД 2-го типа, в том числе 14 пациентов с впервые выявленным СД 2-го типа. Все пациенты находились на лечении в эндокринологическом отделении ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ» в 2020 г.

Результаты и обсуждение

При проведении ФМГ в 43% случаев показатели гликемии имели низкую вариабельность и находились в пределах целевых значений. 57% пациентов имели высокую вариабельность глюкозы, из них 27% исследуемых с большим процентом гипергликемий и 33% частых гипогликемий. Причем доля бессимптомных гипогликемий у пациентов варьировала от 25 до 50%. В 30% случаев мониторинг глюкозы фиксировал гипергликемии, которые не выявлялись при исследовании глюкозы по глюкометру и лабораторно.

Заключение

Неоспоримое преимущество НМГ – возможность оценки и измерения вариабельности гликемии, отражая более полную картину гликемического профиля. Более того, ФМГ, в отличие от контроля глюкозы глюкометром, позволяет выявить случаи бессимптомных гипогликемий для последующей коррекции сахароснижающей терапии и профилактики развития возможных осложнений.

Сведения об авторах

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Москва, Российская Федерация):

Атабаева Хава Вахаевна (Khava V. Atabaeva)* – ординатор кафедры эндокринологии лечебного факультета
E-mail: khava_at@mail.ru

Демидова Татьяна Юльевна (Tatiana Yu. Demidova) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии лечебного факультета
E-mail: t.y.demidova@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6385-540X>

Титова Виктория Викторовна (Victoria V. Titova) – ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета
E-mail: meteora-vica@mail.ru

* Автор для корреспонденции.

Гипотиреоз: непростой диагноз

Долгих Ю.А., Ломонова Т.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 443099, г. Самара, Российская Федерация

Одним из часто встречающихся эндокринных заболеваний является первичный гипотиреоз. Это клинический синдром, который развивается вследствие стойкого дефицита гормонов щитовидной железы или снижения их биологического эффекта на тканевом уровне. Симптомы заболевания неспецифичны, и поэтому врачом первого контакта могут быть самые разные специалисты. Представляется актуальным проводить скрининг тиреоидной недостаточности путем определения уровня тиреотропного гормона у пациентов с различными патологиями. К ним относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение, нарушения липидного и углеводного обменов, нейropsychические нарушения, анемию, заболевания репродуктивной системы.

Ключевые слова: гипотиреоз, артериальная гипертензия, метаболический синдром, бесплодие, когнитивные нарушения, анемия, сахарный диабет

Финансирование. Работа не имела спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Долгих Ю.А., Ломонова Т.В. Гипотиреоз: непростой диагноз // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 4. С. 101–103. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-101-103>

Статья поступила в редакцию 02.11.2021. **Принята в печать** 24.11.2021.

Hypothyroidism: a difficult diagnosis

Dolgikh Yu.A., Lomonova T.V.

Samara State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 443099, Samara, Russian Federation

Primary hypothyroidism is one of the most common endocrine diseases. This is a clinical syndrome that develops as a result of persistent deficiency of thyroid hormones or a decrease of their biological effect at the tissue level. The symptoms of the disease are nonspecific and therefore the first contact doctor can be a variety of specialists. It seems relevant to screen thyroid insufficiency by determining the level of thyroid-stimulating hormone in patients with various pathologies. These include diseases of the cardiovascular system, obesity, disorders of lipid and carbohydrate metabolism, neuropsychiatric disorders, anemia, diseases of the reproductive system.

Keywords: hypothyroidism, arterial hypertension, metabolic syndrome, infertility, cognitive impairment, anemia, diabetes mellitus

Funding. The study had no sponsor support.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Dolgikh Yu.A., Lomonova T.V. Hypothyroidism: a difficult diagnosis. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obucheniye [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 (4): 101–3. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-101-103> (in Russian)

Received 02.11.2021. **Accepted** 24.11.2021.

Первичный гипотиреоз – одно из часто встречающихся эндокринных заболеваний. Гипотиреоз представляет собой клинический синдром, который развивается вследствие стойкого дефицита гормонов щитовидной железы (ЩЖ) или снижения их биологического эффекта на тканевом уровне. Симптомы заболевания неспецифичны, и поэтому врачом первого контакта могут быть самые разные специалисты. Стертая клиническая картина, разнообразие симптомов объясняют тот факт, что от начала заболевания до постановки диагноза может пройти до 10 лет. В связи с этим представляется актуальным проводить скрининг тиреоидной недостаточности, определяя уровень тиреотропного гормона (ТТГ).

Показания для скрининга гипотиреоза

В первую очередь это пациенты с сердечно-сосудистой патологией. Повышение артериального давления (АД) при гипотиреозе встречается чаще, чем в общей популяции. Артериальная гипертензия (АГ) при гипотиреозе в основном диастолическая, при этом наблюдаются повышенная вариабельность АД в дневное время и недостаточное его снижение ночью. Поэтому врачу следует обратить внимание на пациентов с плохо контролируемой АГ, так как некомпенсированный субклинический гипотиреоз (СГ) может быть фактором риска скрытой неэффективности гипотензивной терапии, в то время как компенсация функции ЩЖ снижает уровень амбулаторного АД и улучшает его суточный профиль [1, 2].

Также при наличии метаболического синдрома (МС) стоит исследовать уровень ТТГ, поскольку даже в пределах нормальных значений он имеет прямую ассоциацию с компонентами МС, в том числе с инсулинорезистентностью и ожирением. Определение

ТТГ является обязательным при обследовании пациентов с ожирением, в связи с тем что при гипотиреозе снижаются расход энергии и уровень основного обмена, что способствует набору массы тела.

Обследование с целью исключения гипотиреоза должно проводиться при бесплодии и женщинам, и мужчинам. Мужчины также могут предъявлять жалобы на снижение потенции и либидо, а женщины – на нарушение менструального цикла. При беременности тиреоидная недостаточность может повышать риск преждевременных родов, невынашивания. Также гипотиреоз матери негативно сказывается на нервно-психическом развитии ребенка. Поэтому проведение скрининга необходимо как на этапе планирования беременности, так и во время нее.

Со стороны нервной системы пациентов чаще беспокоят полиневропатии, миопатии, туннельные синдромы, а также когнитивные нарушения: снижение памяти, внимания. Кроме того, более половины пациентов имеют ту или иную степень депрессии и тревожные расстройства. Таким образом, пациентам с указанными проявлениями необходимо проведение скрининга с целью выявления гипофункции ЩЖ.

Показанием для поиска гипотиреоза могут быть гематологические нарушения. Чаще встречаются нормохромная нормоцитарная и гипохромная железodefицитная анемии, реже – B_{12} -дефицитная (пернициозная) анемия [3]. Данные нарушения могут регистрироваться уже при СГ. В этом случае анемии чаще легкого течения, микро- или нормоцитарные. Однако они имеют стойкий характер и усугубляются без лечения, приводя к более выраженному дефициту железа. Назначение заместительной терапии левотироксином способствует улучшению обмена железа [4], особенно у пациентов с изначально более выраженным микроцитозом.

В литературе отмечена связь гипотиреоза и сахарного диабета 2-го типа [5]. Так, заболеваемость диабетом увеличивается в 1,09 раза с каждым удвоением уровня ТТГ, а частота предиабета повышается на 15% при ТТГ >5 мМЕ/л. Поэтому стоит определять уровень ТТГ при нарушениях углеводного обмена.

Заключение

Таким образом, снижение выработки гормонов ЩЖ, даже субклиническое, приводит к многообразным нарушениям, что затрудняет их диагностику. При ряде патологических состояний требуется активная диагностика гипотиреоза. К ним относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности плохо контролируемая АГ, нарушения суточного профиля АД. Также исследование ТТГ необходимо при ожирении, МС, нарушениях липидного и углеводного обменов, нейропсихических нарушениях, анемиях, заболеваниях репродуктивной системы, особенно при бесплодии и патологии беременности.

Сведения об авторах

Долгих Юлия Александровна (Yulia A. Dolgikh)* – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Российская Федерация

E-mail: yulyadoll@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6678-6411>

Ломонова Татьяна Владимировна (Tatyana V. Lomonova) – аспирант кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Российская Федерация

E-mail: t.lomonova@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6601-5043>

Научный руководитель

Вербовой Андрей Феликсович (Andrey F. Verbovoy) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, Самара, Российская Федерация

E-mail: andreyy.verbovoy@rambler.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6123-5610>

Литература

1. Феськова А.А., Дробышева Е.С., Овсянников Е.С., Чернов А.В. Влияние субклинической гипофункции щитовидной железы на клиническое течение гипертонической болезни // Прикладные информационные аспекты медицины. 2015. Т. 18, № 6. С. 35–42.
2. Некрасова Т.А., Стронгин Л.Г., Морозова Е.П., Дурыгина Е.М., Казакова Л.В. Модифицирующее влияние субклинического гипотиреоза на течение артериальной гипертензии: взаимосвязи со скрытой неэффективностью лечения, суточным профилем артериального давления и состоянием органов-мишеней // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2015. Т. 11, № 2. С. 55–62.
3. Вернигородский В.С., Власенко М.В., Паламарчук А.В., Нежинская-Остапенко З.П., Литвинова С.В., Вильчинская Н.В. и др. Терапевтические маски гипотиреоза // Международный эндокринологический журнал. 2018. Т. 14, № 5. С. 503–507.
4. Некрасова Т.А., Стронгин Л.Г., Леденцова О.В. Гематологические нарушения при субклиническом гипотиреозе и их динамика в процессе заместительной терапии // Клиническая медицина. 2013. № 9. С. 29–33.
5. Дубинина И.И., Берстнева С.В. Заместительная терапия левотироксином при сахарном диабете и гипотиреозе // Эффективная фармакотерапия. 2018. № 9. С. 28–33.

* Автор для корреспонденции.

References

1. Fes'kova A.A., Drobysheva E.S., Ovsyannikov E.S., Chernov A.V. Clinical features of arterial hypertension at subclinical thyroid hypofunction. *Prikladnye informacionnye aspekty mediciny* [Applied Information Aspects of Medicine]. 2015; 18 (6): 35–42. (in Russian)
2. Nekrasova T.A., Strongin L.G., Morozova E.P., Durygina E.M., Kazakova L.V. Modifying influence of subclinical hypothyroidism on arterial hypertension: relationship to masked treatment failure, circadian blood pressure profile and target organs status. *Klinicheskaya i eksperimental'naya tireoidologiya* [Clinical and Experimental Thyroidology]. 2015; 11 (2): 55–62. (in Russian)
3. Vernigorodsky V.S., Vlasenko M.V., Palamarchuk A.V., Nezhinskaya-Astapenko Z.P., Litvinova S.V., Vilchinskaya N.V., et al. Therapeutic "masks" of hypothyroidism. *Mižnarodnij endokrinologičnij žurnal* [International Journal of Endocrinology]. 2018; 14 (5): 503–7. (in Russian)
4. Nekrasova T.A., Strongin L.G., Ledentsova O.V. Hematological disturbances in subclinical hypothyroidism and their dynamics during substitution therapy. *Klinicheskaya meditsina* [Clinical Medicine]. 2013; 9: 29–33. (in Russian)
5. Dubinina I.I., Berstneva S.V. Levothyroxine replacement therapy at diabetes mellitus and hypothyroidism. *Effektivnaya farmakoterapiya* [Effective pharmacotherapy]. 2018; 9: 28–33. (in Russian)

Преимущества применения эмпаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и циррозом печени

Моргун Л.Ю.^{1,2}, Мамедгусейнов Х.С.¹

¹ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов», 117198, г. Москва, Российская Федерация

² Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева» Департамента здравоохранения города Москвы, 129327, г. Москва, Российская Федерация

В связи со стремительным ростом заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа (СД2) во всем мире параллельно растет практически значимый интерес научного сообщества к поиску новых сахароснижающих препаратов. В статье демонстрируются результаты исследования, где сравниваются 2 класса новых пероральных гипогликемических препаратов: ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) (эмпаглифлозин) и селективный обратимый конкурентный ингибитор дипептидилпептидазы-4 (саксаглиптин) у пациентов с СД2 и циррозом печени. В ходе исследования выявлены преимущества применения препаратов группы иНГЛТ-2 у пациентов данной группы.

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, цирроз печени, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа, эмпаглифлозин

Финансирование. Работа не имела спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Моргун Л.Ю., Мамедгусейнов Х.С. Преимущества применения эмпаглифлозина у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и циррозом печени // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 4. С. 103–105. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-103-105>

Статья поступила в редакцию 02.11.2021. Принята в печать 24.11.2021.

Benefits of using empagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and liver cirrhosis

Morgunov L. Yu.^{1,2}, Mamedguseynov H.S.¹

¹ People's Friendship University of Russia (RUDN University), 117198, Moscow, Russian Federation

² City Clinical Hospital named after A.K. Eramishantsev, 129327, Moscow, Russian Federation

Due to the rapid increase of the prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM) worldwide, the practically significant interest of the scientific community in the search for new glucose-lowering drugs is growing in parallel. The article demonstrates the results of a study that compares two classes of new oral hypoglycemic drugs – sodium glucose co-transporter type 2 inhibitors (iNGLT-2) (empagliflozin), and a selective reversible competitive inhibitor of dipetidyl peptidase-4 (saxagliptin) in patients with T2DM and liver cirrhosis. The study revealed the advantages of using iNGLT-2 agents in patients of this group.

Keywords: type 2 diabetes mellitus, liver cirrhosis, type 2 sodium-glucose cotransporter inhibitors, empagliflozin

Funding. The study had no sponsor support.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Morgunov L. Yu., Mamedguseynov H.S. Benefits of using empagliflozin in patients with type 2 diabetes mellitus and liver cirrhosis. *Endokrinologiya: novosti, mneniya, obucheniye* [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 (4): 103–5. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-103-105> (in Russian)

Received 02.11.2021. Accepted 24.11.2021.

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) в мире стремительно увеличивается. Практически каждый орган является мишенью «лакового убийцы», что приводит к инвалидизации таких больных, и гепатопатология в виде хронического гепатита, жировой дистрофии или неалкогольной болезни печени, стремительно прогрессирующего фиброза и, наконец, цирроз печени (ЦП) – не исключение. Это подвигает научное сообщество к проведению клинических исследований для поиска наиболее подходящей терапии, которая обеспечит и лечение существующих заболеваний, и профилактику ожидаемых осложнений. В лечении СД 2-го типа (СД2) традиционно препаратом выбора первой линии терапии является гипогликемическое средство из группы бигуанидов – метформин, имеющий большую доказательную базу, зарекомендовавший себя позитивно как для лечения, так и для профилактики данного заболевания. Однако прогресс не стоит на месте и с недавних пор в лечение СД2 широко внедрились современные сахароснижающие препараты нового класса – ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2), а также ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4). Механизм действия первого заключается в ингибировании реабсорбции глюкозы в проксимальных канальцах почек, что способствует увеличению экскреции глюкозы с мочой. Таким образом, достигается стабильный хронический гипогликемический эффект на ренальном уровне. Большие надежды возлагаются на эти препараты в связи с выявленным кардио- и нефропротективным, гипотензивным и метаболическим эффектами, механизмы которых на сегодняшний день находятся на стадии изучения. Механизм действия иДПП-4 связан с высокоселективной блокадой активности субстратов фермента ДПП-4, ответственного за деградацию инкретинов, выброс которых индуцирован приемом пищи. Опираясь на вышеперечисленное, наш научный медицинский интерес сподвиг к проведению исследования, где мы в течение 6 мес сравнивали эффект 2 новых перспективных классов препаратов – иНГЛТ-2 на примере эмпаглифлозина и иДПП-4 на примере саксаглиптина.

Цель работы – сравнение эффективности и безопасности применения сахароснижающих таблетированных препаратов из группы иДПП-4 (саксаглиптин) и иНГЛТ-2 (эмпаглифлозин) у больных с СД2 и ЦП.

Материал и методы

В исследовании приняли участие 30 пациентов с ЦП, печеночно-клеточной недостаточностью и СД2, разделенных на 2 группы. Средний возраст пациентов 1-й группы ($n=15$) составил $61,7 \pm 3,4$ года, 2-й группы ($n=15$) – $59,8 \pm 3,7$ года, средняя длительность СД2 в 1-й группе составила $8,1 \pm 2,3$ года, во 2-й – $7,8 \pm 1,8$ года. Функциональное состояние печени оценивали по шкале Чайлда–Пью. В 1-й группе сумма баллов составила 9 ± 2 , во 2-й – 10 ± 3 . У всех пациентов отмечался асцит (от легкого до напряженного). Степень энцефалопатии в обеих группах расценивалась как легкая. В 1-й группе средний уровень билирубина составил $56 \pm 7,3$ мкмоль/л, протромбиновый индекс (ПТИ) – $49 \pm 3,1\%$, уровень альбумина – $31,75 \pm 6,2$ г/л, уровень аланин-трансаминазы (АЛТ) – $143,57 \pm 74,25$ ед/л, ЩФ – $168 \pm 18,1$ ед/л, соотношение альбумин/билирубин по шкале ALBI составляло $-1,565$ (II степень). Во 2-й группе средний уровень билирубина – $51 \pm 5,9$ мкмоль/л, ПТИ – $54,0 \pm 2,8\%$, уровень альбумина – $33,9 \pm 7,5$ г/л, уровень АЛТ – $159,84 \pm 64,9$ ед/л, ЩФ – $189,4 \pm 24,3$ ед/л, соотношение альбумин/билирубин по шкале ALBI составило $-1,73$ (III степень), Уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) в 1-й группе составил $8,6 \pm 1,3\%$, во 2-й – $8,9 \pm 2,7\%$. Пациентам 1-й группы был назначен саксаглиптин в дозе 5 мг 1 раз в сутки, пациентам 2-й группы – эмпаглифлозин в дозе 10 мг 1 раз в сутки. Все пациенты получали необходимую диету, сорбенты и гепатопротекторы.

Результаты

Через 6 мес после начала лечения функциональное состояние печени по шкале Чайлда–Пью изменилось в положительную сторону во 2-й группе: снизился уровень маркеров фиброза печени, а также показатели гликемии. Уровень HbA1c в 1-й группе снизился до $8,1 \pm 1,9\%$, во 2-й – до $7,7 \pm 1,3\%$. После лечения уровень билирубина в 1-й группе составил $55,3 \pm 6,2$ мкмоль/л, уровень альбумина – $30,53 \pm 5,2$ г/л, уровень АЛТ – $151,17 \pm 22,4$ ед/л, уровень ЩФ – $163 \pm 24,2$ ед/л, уровень ПТИ – $53,0 \pm 3,5\%$. Во 2-й группе уровень билирубина составил $45 \pm 5,6$ мкмоль/л, альбумина – $39,82 \pm 3,9$ г/л, АЛТ – 129 ± 35 ед/л, ЩФ – $141 \pm 25,6$ ед/л, ПТИ – $67,0 \pm 4,1\%$. Изменилось соотношение альбумин/билирубин по шкале ALBI: в 1-й группе стало $-1,275$ (II степень), во 2-й – $-2,265$ (I степень).

Заключение

В результате проведенного исследования установлено, что у пациентов с ЦП, печеночно-клеточной недостаточностью и СД2 в качестве препарата выбора при использовании пероральной сахароснижающей терапии предпочтительно использование эмпаглифлозина, который показал более выраженное позитивное влияние на компенсацию углеводного обмена и функцию печени.

Сведения об авторах

Моргунов Леонид Юльевич (Leonid Yu. Morgunov)* – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института ФГАОУ ВО РУДН, заведующий эндокринологическим отделением ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ», Москва, Российская Федерация
E-mail: morgunov.l.y@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-6608-2825>

* Автор для корреспонденции.

Мамедгусейнов Хафиз Суреддинович (Hafiz S. Mamedguseynov) – аспирант кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии, гематологии и клинической лабораторной диагностики Медицинского института ФГАУ ВО РУДН, Москва, Российская Федерация

E-mail: hafiz094@bk.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1596-5687>

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам у 12-летней девочки: описание клинического случая

Ромайкина Д.С.¹, Матвеева А.А.², Окминян Г.Ф.², Киселева Е.В.², Самсонова Л.Н.²

¹ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

² Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 125993, г. Москва, Российская Федерация

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам (СРТГ) – наследственное заболевание, характеризующееся пониженной чувствительностью тканей-мишеней к гормонам щитовидной железы (ЩЖ). Клиническая вариабельность СРТГ обусловлена различными мутациями (в зависимости от их локализации и степени функциональной активности) и разной чувствительностью тканей органов-мишеней к тиреоидным гормонам. В описанном клиническом случае СРТГ был заподозрен на основании клинических проявлений, лабораторных данных и подтвержден молекулярно-генетическим исследованием. Из-за разнообразных клинических проявлений, низкой распространенности и недостаточных знаний этого синдрома эндокринологи не включают СРТГ в дифференциально-диагностический алгоритм заболеваний ЩЖ, неправильно интерпретируют полученные результаты исследований, что обуславливает ошибочную тактику лечения и несвоевременную диагностику заболевания.

Ключевые слова: щитовидная железа, синдром резистентности к тиреоидным гормонам, ген рецептора тиреоидных гормонов, *THRβ*

Финансирование. Работа не имела спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Ромайкина Д.С., Матвеева А.А., Окминян Г.Ф., Киселева Е.В., Самсонова Л.Н. Синдром резистентности к тиреоидным гормонам у 12-летней девочки: описание клинического случая // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 4. С. 105–107. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-105-107>

Статья поступила в редакцию 02.11.2021. **Принята в печать** 24.11.2021.

Thyroid hormone resistance syndrome in a 12-year-old girl: clinical case description

Romaykina D.S.¹, Matveeva A.A.², Okminyan G.F.², Kiseleva E.V.², Samsonova L.N.²

¹ Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

² Russian Medical Academy of Continuing Professional Education of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 125993, Moscow, Russian Federation

Thyroid hormone resistance syndrome (THRS) is a hereditary syndrome characterized by targeted organ tissue hyposensitivity to thyroid hormones. Clinical variability of THRS is contingent on various mutations (depending on their localization and level of functional activity) and diverse sensitivity of targeted organ tissue to thyroid hormones. In the described medical case THRS was suspected based on the clinical manifestations, lab collected data and confirmed by the molecular genetic testing. Due to various clinical presentations, rare prevalence, low awareness and lack of knowledge on this syndrome, endocrinologists fail to include THRS in differential diagnosis algorithm of thyroid disorders, misinterpret the lab results, which lead to inaccurate treatment strategy and delayed diagnosis.

Keywords: thyroid gland, thyroid hormone resistance syndrome, thyroid hormone receptor gene, *THRβ*

Funding. The study had no sponsor support.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

For citation: Romaykina D.S., Matveeva A.A., Okminyan G.F., Kiseleva E.V., Samsonova L.N. Thyroid hormone resistance syndrome in a 12-year-old girl: clinical case description. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obucheniye [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 (4): 105–7. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-105-107> (in Russian)

Received 02.11.2021. **Accepted** 24.11.2021.

Синдром резистентности к тиреоидным гормонам (СРТГ) является наследственным, характеризующимся пониженной чувствительностью тканей-мишеней к гормонам щитовидной железы (ЩЖ).

В настоящее время описано около 500 случаев СРТГ. Распространенность этого синдрома составляет 1:40 000 новорожденных, встречается с одинаковой частотой у лиц обоего пола. Тип наследования в большинстве случаев аутосомно-доминантный, мутации *de novo* возникают примерно в каждом 5-м наблюдении. Документировано более 100 различных мутаций в гене рецептора тиреоидных гормонов. Степень выраженности гормональной резистентности при одинаковых мутациях гена может быть различной.

Клиническая вариабельность СРТГ обусловлена различными мутациями (в зависимости от их локализации и степени функциональной активности) и разной чувствительностью тканей органов-мишеней к ТГ.

Клинический случай

Больная М., 2008 г.р., наследственность по эндокринопатиям неотягощена.

Впервые обратилась к эндокринологу в возрасте 10 лет в связи с избыточной массой тела. При обследовании (в скобках указана норма): повышение уровня св.Т₄ – 30,6 (12–22) пмоль/л, св.Т₃ – 13,25 (5,1–9,3) пмоль/л, при отсутствии супрессии ТТГ – 3,6 (0,35–5,5) мМЕ/мл. Уровень антител (АТ) к тиреопероксидазе (ТПО), тиреоглобулину (ТГ) и рецептору тиреотропного гормона (рТТГ) в пределах референсных значений: АТПО – 11,5 (0–60), АТТГ – 14,2 (0–60), АТрТТГ – <0,3 (0–1,75). По данным эхографии: общий объем ЩЖ – 9,0 (до 8,4) см³, эхогенность и эхоструктура не изменены.

Через 6 мес появились жалобы на сердцебиение, одышку, эмоциональную лабильность. При повторном обследовании сохранялось повышение св.Т₄ – 27,75 (8–17) пмоль/л и св.Т₃ – 12,2 (4,3–6,8) пмоль/л, при нормальном уровне ТТГ – 3,89 (0,4–4,2) мМЕ/мл. Назначена антигипертиреозная терапия препаратом из группы тиамазола. На фоне терапии отмечено улучшение самочувствия. Через 1 мес после начала тиреостатической терапии отмечено повышение ТТГ до 11,93 (0,4–4,2) мМЕ/л при повышенном уровне св.Т₃ – 11,44 (4,30–6,80) пмоль/л и св.Т₄ – 27,26 (8,00–17,00) пмоль/л; терапия была отменена. После отмены лечения гипертиреоз сохранялся, св.Т₃ – 11,78 (4,30–6,80) пмоль/л, св.Т₄ – 30,16 (8,00–17,00) пмоль/л, но уровень ТТГ приблизился к исходному: 4,83 (0,40–4,20) мМЕ/л. Пациентку продолжали беспокоить тахикардия, одышка преимущественно в вечернее время, в связи с чем периодически проводилась терапия неселективными β-адреноблокаторами.

При обследовании в 12 лет без медикаментозной терапии: рост – 161 см; SDS роста: +1,2; масса тела – 61,5 кг, индекс массы тела – 23,7 кг/м², SDS индекса массы тела: +1,8. Половая формула по Tanner: В4, Р4. Увеличение ЩЖ I степени по классификации Всемирной организации здравоохранения. Клинические симптомы тиреотоксикоза отсутствовали. Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 82 в минуту, артериальное давление – 110/80 мм рт.ст.

Гормональное обследование: ТТГ – 1,51 (0,7–6,5) мМЕ/мл, св.Т₃ – 6,99 пмоль/л (1,55–6,38 пг/мл), св.Т₄ – 1,87 (0,88–1,76) нг/мл, общ. Т₄ – 15,1 мкг/дл (4,74–12,6), общ. Т₃ – 2,06 (0,72–2,13) пмоль/л, АТПО – 49,5 (0–60) пмоль/л, АТТГ – 15,7 (0–60) пмоль/л, АТрТТГ – <0,3 (0–1,75) пмоль/л. При УЗИ объем ЩЖ – 11,1 см³, эхогенность и эхоструктура не изменены.

По данным электрокардиографии: миграция водителя ритма, ЧСС – 60–73 в минуту, отклонение электрической оси сердца влево, неполная блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Пациентка осмотрена офтальмологом, патологии не выявлено.

На основании анализа полученных данных высказано предположение о наличии синдрома резистентности к тиреоидным гормонам. По данным молекулярно-генетического исследования, в гене *THRβ* (NM 000461.4) выявлен гетерозиготный вариант exon9:c.958 C>T:p.R320C(rs121918696;HGMD:CM 930705) патогенный, описан при синдроме резистентности к тиреоидным гормонам (OMIM #188570).

На основании данных анамнеза, физикального осмотра и гормонального исследования (повышение уровней Т₃, Т₄ при нормальном значении ТТГ), результата молекулярно-генетического исследования установлен диагноз: СРТГ. Тактика: динамическое наблюдение.

Заключение

В описанном клиническом случае СРТГ был заподозрен на основании клинических проявлений, лабораторных данных и подтвержден молекулярно-генетическим исследованием. Из-за разнообразных клинических проявлений, низкой распространенности и недостаточных знаний этого синдрома эндокринологи не включают его в дифференциально-диагностический алгоритм заболеваний ЩЖ, неправильно интерпретируют полученные результаты исследований, что обуславливает ошибочную тактику лечения и несвоевременную диагностику заболевания.

Сведения об авторах

Ромайкина Дарья Сергеевна (Darya S. Romaykina) – студент ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация

E-mail: dasharmk@icloud.com

<https://orcid.org/0000-0003-0281-3104>

Матвеева Анна Андреевна (Anna A. Matveeva) – ординатор кафедры детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Российская Федерация

E-mail: doctormatveeva@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3194-3645>

Окминян Гоар Феликсовна (Goar F. Okminyan)* – кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Российская Федерация

E-mail: okminyangoar@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-1578-5870>

Киселева Елена Валентиновна (Elena V. Kiseleva) – кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Российская Федерация

E-mail: tabane@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3704-3699>

Научный руководитель

Самсонова Любовь Николаевна (Lyubov N. Samsonova) – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой детской эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва, Российская Федерация

E-mail: samsonovarmapo@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0003-0208-4116>

Изучение роли факторов риска развития гестационного сахарного диабета, течение беременности и родов

Хагуш Л.А., Демидова Т.Ю., Ушанова Ф.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 117997, г. Москва, Российская Федерация

В данном исследовании изучали роль факторов риска развития гестационного сахарного диабета (ГСД), течение беременности и родов при ГСД. Факторы риска являются прогностическими параметрами: возраст женщин старше 30 лет, ожирение, рождение крупного плода у женщин 31–40 лет, сопутствующие заболевания, отягощенная наследственность. Кесарево сечение и самостоятельные роды имели одинаковую частоту среди женщин от 20–30 лет и 30–40 лет. При выявлении ГСД необходимо контролировать уровень глюкозы в крови, нормализовать массу тела беременных, провести коррекцию выявленных заболеваний и отклонений, что позволит иметь благоприятные исходы беременности и родов.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, ожирение, наследственность, крупный плод, возраст

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Хагуш Л.А., Демидова Т.Ю., Ушанова Ф.О. Изучение роли факторов риска развития гестационного сахарного диабета, течение беременности и родов // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10, № 4. С. 107–108. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-107-108>

Статья поступила в редакцию 02.11.2021. Принята в печать 24.11.2021.

Studying the role of risk factors of development of gestational diabetes mellitus, pregnancy and labor

Khagush L.A., Demidova T.Yu., Ushanova F.O.

Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 117997, Moscow, Russian Federation

In this study we examined the role of risk factors for the development of gestational diabetes mellitus (GDM), gestation course and labor in GDM. Risk factors are prognostic parameters: the age of women over 30 years old, obesity, the birth of a large fetus in women 31–40 years old, concomitant diseases, burdened heredity. Caesarean section and spontaneous delivery had the same frequency among women aged 20–30 and 30–40 years. When detecting GDM, it is necessary to control the blood glucose level, normalize the body weight of pregnant women, correct the identified diseases and deviations, that will allow to have favorable outcomes of pregnancy and childbirth.

Keywords: gestational diabetes mellitus, obesity, heredity, large fetus, age

Funding. The study had no sponsor support.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

* Автор для корреспонденции.

For citation: Khagush L.A., Demidova T. Yu., Ushanova F.O. Studying the role of risk factors of development of gestational diabetes mellitus, pregnancy and labor. Endokrinologiya: novosti, mneniya, obucheniye [Endocrinology: News, Opinions, Training]. 2021; 10 (4): 107–8. DOI: <https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-107-108> (in Russian)

Received 02.11.2021. **Accepted** 24.11.2021.

Цель – изучение роли факторов риска развития гестационного сахарного диабета (ГСД), течение беременности и родов при ГСД.

Материал и методы

Было проанализировано 511 карт беременных с ГСД. 212 беременных родоразрешены в родильном доме № 8 ГБУЗ «ГКБ им. В.П. Демикова ДЗМ» (Москва).

Результаты

Беременных с ГСД в возрасте от 20–30 лет было 39,7% ($n=203$), от 31–40 лет – 60,2% ($n=308$). Наследственность по сахарному диабету (СД) отягощена у 38,7% (198). Самостоятельные роды составили 82% (174), кесарево сечение (КС) – 17,9% (38). КС у женщин от 20–30 лет – 8,9% (19), КС от 31–40 лет – 8,9% (19). У беременных с отягощенной наследственностью рождение крупного плода наблюдалось в среднем в 3,5% (7) случаев, роды путем КС – 8,5% (17) случаев. Рождение крупного плода в настоящем исследовании наблюдалось в 6,7% (21) случаев и КС – 9,9% (21) (без отягощенного анамнеза). В группе из 212 беременных рождение крупного плода было зарегистрировано в 12,2% (26) случаев. Средний возраст рожениц: 20–30 лет – 4,2% (9) и 31–40 лет – 8% (17). У 21,3% (109) беременных был выставлен диагноз «ожирение», субклинический гипотиреоз – 8% (41), варикозная болезнь – 1,7% (9). Беременные с ожирением, родоразрешенные путем КС, составили 4,7% (10); без ожирения, но родоразрешенные путем КС – 12,2% (26); с ожирением и с рождением крупного плода – 2,8% (6); без ожирения и с рождением крупного плода – 9,9% (21); с ожирением и субклиническим гипотиреозом – 4,2% (9); без ожирения и с субклиническим гипотиреозом – 47,1% (100). Родоразрешение путем КС с сопутствующей варикозной болезнью – 1,4% (3) случаев.

Заключение

Факторы риска являются прогностическими параметрами: возраст женщин старше 30 лет, ожирение, рождение крупного плода у женщин 31 года – 40 лет, сопутствующие заболевания, отягощенная наследственность. КС и самостоятельные роды имели одинаковую частоту среди женщин от 20 до 30 лет и от 30 до 40 лет. По данным атласа Международной диабетической федерации, в 2019 г. распространенность гипергликемии у беременных составила около 15,8%, из них 83,6% случаев были связаны с ГСД. Врачам – акушерам-гинекологам, эндокринологам при выявлении факторов риска необходимо использовать методы прегравидарной подготовки к беременности. При выявлении ГСД необходимо контролировать уровень глюкозы в крови, нормализовать массу тела беременных, провести коррекцию выявленных заболеваний и отклонений, что позволит обеспечить благоприятные исходы беременности и родов.

Сведения об авторах

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, Российская Федерация:

Хагущ Лаура Аслановна (Laura A. Khagush)* – клинический ординатор кафедры эндокринологии лечебного факультета
E-mail: laura.khagush.95@bk.ru

Демидова Татьяна Юльевна (Tatiana Yu. Demidova) – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета

E-mail: t.y.demidova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6385-540X>

Ушанова Фатима Омариовна (Fatima O. Ushanova) – ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета

E-mail: fati_2526@mail.ru

* Автор для корреспонденции.